DRUG ACCOUNTABILITY – Injecties toegediend op site

Medicatie: Golumumab / Placebo 50 mg (1 voorgevulde spuit) Patiënt N°: ……

Periode	Kit nummer		Vervaldatum (dd/maa/jr)	Dag van injectie (dd/maa/jr)	Uur van injectie (- -u - -)	Injectieplaats (ABDomen, BovenBeen, BovenArm)		Paraaf Site personeel	Is de volledige dosis toegediend? (één omcirkelen)	*Zo neen: reden onvolledige toediening
						Links	Rechts			
Week 0			___ / ___ / ____	___ / ___ / ____	___ : ___				Ja Nee*	
Week 4			___ / ___ / ____	___ / ___ / ____	___ : ___				Ja Nee*	
Week 8			___ / ___ / ____	___ / ___ / ____	___ : ___				Ja Nee*	
Week 12			___ / ___ / ____	___ / ___ / ____	___ : ___				Ja Nee*	
Week 16			___ / ___ / ____	___ / ___ / ____	___ : ___				Ja Nee*	
Week 20			___ / ___ / ____	___ / ___ / ____	___ : ___				Ja Nee*	
Week 24	Blinded	Open-label	___ / ___ / ____	___ / ___ / ____	___ : ___				Ja Nee*	
Week 28	Blinded	Open-label	___ / ___ / ____	___ / ___ / ____	___ : ___				Ja Nee*	

***Zo neen: als de volledige dosis NIET is toegediend, mogelijke redenen voor de onvolledige toediening:** 1) Studiegeneesmiddel gelekt uit injectiespuit; 2) Studiegeneesmiddel gelekt uit injectieplaats; 3) Moeilijk vast te houden; 4) Defect injectiespuit tijdens injectie; 5) Toedieningsinstructies studiegeneesmiddel moeilijk te begrijpen; 6) Andere reden